

AUTOEVALUACIÓN N° 09

Dr. Leonardo Sánchez Saldana

1. **Las diversas formas clínicas de las infecciones producidas por el virus papiloma humano se deben a:**
 - a. La situación geográfica donde vive el huésped
 - b. La edad y sexo del huésped
 - c. La inmunidad del huésped
 - d. Los diferentes serotipos de virus papiloma humano
 - e. Al poder oncogénico del virus.
2. **¿Cuál de las siguientes combinaciones de fármacos se utiliza en el tratamiento de la lepra tuberculoide?**
 - a. Rifampicina y estreptomina
 - b. Sulfonas y rifampicina
 - c. Talidomida y lampren
 - d. Lampren y rifampicina
 - e. Talidomida y corticoides
3. **El herpes zoster**
 - a. Es producida por un poxvirus
 - b. Es la forma de primoinfección del virus del herpes simple
 - c. Es la segunda manifestación clínica del virus varicela-zoster
 - d. Es la manifestación clínica de infección por parvovirus B19
 - e. Es la forma de primoinfección del herpesvirus humano-6
4. **La variedad clínica más severa del acné es:**
 - a. Acné comedogénico
 - b. Acné pápulo-pustuloso
 - c. Acné nódulo-quístico
 - d. Acné cicatricial
 - e. Acné conglobata
5. **El gremio de trabajadores que presenta con más frecuencia dermatitis de contacto ocupacional, debido al alto contenido de cromo en los materiales que usa es:**
 - a. Albañiles
 - b. Joyeros
 - c. Textileros
 - d. Carpinteros
 - e. Zapateros
6. **¿Cuál de las siguientes lesiones sugiere el diagnóstico de escleritis tuberosa?**
 - a. Fenómeno de Raynaud
 - b. Pápulas de Gottron
 - c. Angiofibromas periungueales
 - d. Nódulos de Lisch
 - e. Nevus acrómico
7. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en la escabiosis?**
 - a. Afecta niños y adultos
 - b. Es una infestación contagiosa
 - c. Produce prurito preferentemente nocturno
 - d. Afecta las plantas de los pies en los adultos
 - e. Es producida por el *Sarcoptes scabiei*.
8. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con la dermatitis por contacto irritativa?**
 - a. Es una reacción cutánea de tipo inmunológico
 - b. Se presenta por acción directa de la sustancia
 - c. Afecta con mayor frecuencia las manos y pies
 - d. Afecta generalmente a niños sin o con antecedentes de atopía
 - e. Afecta con mayor frecuencia a mujeres.
9. **Las formas clínicas más frecuentes de dermatitis por contacto son:**
 - a. Las formas eczematosas agudas
 - b. Las producidas principalmente por ácidos y álcalis
 - c. Las formas liquenificadas crónicas
 - d. Las dermatitis de contacto irritativa y la alérgica
 - e. Las formas no eczematosas.
10. **Señale cuál es la célula más importante en la producción de urticaria.**
 - a. Mastocito
 - b. Linfocito
 - c. Eosinófilo
 - d. Monocito
 - e. Macrófago



- 11. ¿Cuál de los siguientes antihistamínico H1 es de primera generación?**
- Astemizol
 - Hidroxicina
 - Cetirizina
 - Loratadina
 - Levocetiricina
- 12. La absorción de los glucocorticoides tópicos es mayor en:**
- Palmas y plantas
 - Tórax y abdomen
 - Miembros inferiores
 - Miembros superiores
 - Cara, cuello y pliegues.
- 13. La eficacia y los efectos indeseables de los glucocorticoides tópicos están condicionados por:**
- La potencia del glucocorticoide
 - La dosis empleada
 - La capacidad de penetración
 - El vehículo empleado
 - Todos los anteriores
- 14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en la dermatitis de contacto alérgica?**
- Es producida por la acción directa de una sustancia química
 - Es producida por una reacción de tipo no inmunológica
 - Requiere contacto previo con el alérgeno causante
 - Es una reacción de sensibilidad de tipo III
 - Se presenta en pacientes con prueba de parche negativas.
- 15. La dermatitis de Berloq se produce como respuesta al estímulo fotosensibilizante del sol en la piel expuesta al contacto con cítricos por su contenido en:**
- Hidroxiprolina
 - Psoralenos
 - Compuestos bencénicos
 - Esencia de licopodio
 - Todas las anteriores
- 16. ¿Cuál es la estructura que se afecta en la enfermedad de Fox-Fordyce?**
- Glándulas ecrinas
 - Glándulas apocrinas
 - Folículo pilosebáceo
 - Glándulas de Moll
 - Glándulas de Meibomio
- 17. ¿Cuál de los siguientes medicamentos producirá una mejoría rápida en el acné fulminans?**
- Antibióticos orales
 - Retinoides orales
 - Corticoides sistémicos
 - Sulfonas
 - Talidomida.
- 18. ¿Cuál de los siguientes medicamentos puede ser responsable de una erupción acneiforme?**
- Griseofulvina
 - Colchicina
 - Metotrexato
 - Litio
 - Sulfonas
- 19. ¿Cual de los siguientes síndromes presenta un déficit sérico de cobre?**
- Síndrome de Menkes
 - Tricotiodistrofia
 - Moniletrix
 - Síndrome del pelo impenable
 - Síndrome de Refsum
- 20. ¿En cuál de las formas clínicas de ictiosis la capa granulosa esta disminuida o ausente?**
- Ictiosis lamelar
 - Ictiosis ligada a X
 - Ictiosis vulgar
 - Hiperqueratosis epidermolítica
 - Eritrodermia ictiosiforme congénita ampollar
- 21. ¿Cual de las siguientes inmunodeficiencias se caracteriza por un defecto en la fagocitosis de los polimorfonucleares?**
- Inmunodeficiencia combinada severa
 - Ataxia telangiectasia
 - Síndrome de Wisckot-Aldrich
 - Candidiasis mucocutánea crónica
 - Enfermedad granulomatosa crónica.
- 22. ¿En cual de los siguientes síndromes el pelo presenta un déficit de sulfuro?**
- Síndrome de Menkes
 - Síndrome de Refsum
 - Alopecia areata
 - Tricotiodistrofia
 - Síndrome de pelo impenable.
- 23. El primer paso en el tratamiento de la dermatitis de contacto debe ser:**



- a. Antihistamínicos por vía oral
 - b. Suprimir el contactante responsable
 - c. Uso inmediato de corticoides de alta potencia
 - d. Uso inmediato de corticoides de baja potencia
 - e. Uso inmediato de antihistamínicos tópicos y corticoides sistémicos.
- 24. ¿En cual de las formas clínicas de urticaria es frecuente el uso de la epinefrina como tratamiento de urgencia?**
- a. Edema angioneurótico
 - b. Urticaria crónica
 - c. Urticaria solar
 - d. Urticaria física
 - e. Urticaria colinérgica
- 25. ¿El signo de exclamación se observa en cuál de las siguientes entidades clínicas?**
- a. Alopecia cicatricial
 - b. Alopecia androgénica
 - c. Tricotilomanía
 - d. Alopecia areata
 - e. Querion de celso
- 26. ¿Cuál es la localización más frecuente del tumor de Merkel?**
- a. Cabeza y cuello
 - b. Tronco y abdomen
 - c. Extremidades superiores
 - d. Extremidades inferiores
 - e. Palmas y plantas
- 27. Los microabscesos de polimorfonucleares en la capa córnea (microabscesos de Munro), son característicos de:**
- a. Micosis fungoide
 - b. Síndrome de Sezary
 - c. Enfermedad de Bowen
 - d. Psoriasis
 - e. Liquen plano
- 28. La forma más frecuente de cáncer cutáneo es:**
- a. Enfermedad de Bowen
 - b. Enfermedad de Paget
 - c. Carcinoma basocelular
 - d. Carcinoma epidermoide
 - e. Melanoma maligno
- 29. La espongirosis es un hallazgo histológico característico de:**
- a. Liquen plano
 - b. Eczema
 - c. Granuloma anular
 - d. Psoriasis en placa
 - e. Linfoma de células T.
- 30. La acantolisis es un hallazgo histológico característico de:**
- a. Penfigoide ampollar
 - b. Dermatitis herpetiforme
 - c. Epidermolisis bulosa distrófica
 - d. Eritema multiforme ampollar
 - e. Pénfigos
- 31. ¿Cuál de las siguientes es una complicación de la eritrodermia?**
- a. Deshidratación
 - b. Pérdida de proteínas y electrolitos
 - c. Insuficiencia cardíaca
 - d. Infecciones
 - e. Todas las anteriores
- 32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en la enfermedad de Darier?**
- a. Es una genodermatosis con alteración en la queratinización
 - b. Se presenta exclusivamente en el sexo masculino
 - c. Se debe a alteraciones del cromosoma 12 en el gen ATP2A2
 - d. Prevalece en la niñez
 - e. El calor y la humedad son factores desencadenantes
- 33. La manifestación clínica característica de la enfermedad de Darier es:**
- a. Erupción papular queratósica en áreas seboreicas
 - b. Placas verrucosas en los pliegues
 - c. Pápulas poligonales aplanadas en el dorso de las manos
 - d. Micropápulas en las plantas y palmas de las manos.
 - e. Todas las anteriores
- 34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la podofilina en la verruga genital?**
- a. Actúa como citotóxico
 - b. Se usa en solución alcohólica
 - c. Se puede emplear en tintura de benjuí
 - d. No se debe emplear en las embarazadas
 - e. Todas son ciertas
- 35. La causa más frecuente de prurigo infantil por**



- insectos en nuestro medio son:**
- Las hormigas
 - Los zancudos
 - Los chinches
 - El sarcoptes scabiei
 - Arañas.
- 36. Las medidas preventivas para el prurigo infantil por insectos es:**
- Usar mosquiteros
 - Cerrar las ventanas
 - Fumigar
 - Evitar tener animales en casa
 - Todas las anteriores
- 37. ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce con mayor frecuencia fotosensibilidad?**
- Antipalúdicos
 - Corticoides fluorados
 - Tetraciclinas
 - Eritromicinas
 - Betacarotenos.
- 38. El agente etiológico del eritema infeccioso es:**
- Hesper virus tipo 2
 - Coxsackie virus A16
 - Herpesvirus tipo 6
 - Parvovirus B19
 - Streptococo beta hemolítico grupo II
- 39. ¿Cuál de las siguientes no es una manifestación cutánea característica de la dermatomiositis?**
- Pittin ungueal
 - Rash en heliotropo en párpados
 - Cambios cutáneos poiquilodérmicos en el cuello
 - Edema periorbital
 - Capilares dilatados periungueales y cutícula engrosada.
- 40. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se caracteriza por un defecto en la absorción de zinc?**
- Dermatitis herpetiforme
 - Epidermoliis ampollosa
 - Acrodermatitis enteropática
 - Porfiria cutánea tarda
 - Protoporfiria eritropoyética.
- 41. ¿De qué entidad es característico el fenómeno de Koebner?**
- Pénfigo
 - Psoriasis
 - Lupus eritematoso discoide
 - Morfea
 - Necrobiosis lipoídica.
- 42. El agente etiológico de la leucoplasia vellosa asociado al SIDA es:**
- Papilomavirus
 - Virus de Epstein Barr
 - Herpesvirus tipo 8
 - Citomegalovirus
 - Estafilococo aureus
- 43. La denominada “piel de zapa” o “piel de chagrin” es característica de:**
- Lupus eritematoso
 - Ictiosis vulgar
 - Psoriasis eritrodérmica
 - Esclerosis tuberosa
 - Neurofibromatosis II
- 44. El lupus vulgar es:**
- Una variedad clínica del lupus eritematoso discoide
 - Una manifestación clínica del lupus eritematosos sistémico
 - Una forma clínica de la tuberculosis cutánea
 - Una variedad clínica de la sarcoidosis cutánea
 - Una forma de vasculitis.
- 45. La hidrosadenitis es:**
- Una foliculitis superficial
 - Una infección del folículo pilosebáceo
 - Una infección de la glándula sudorípara ecrina
 - Una infección de la glándula sebácea
 - Una infección de la glándula sudorípara apocrina
- 46. En cual de las siguientes entidades no está involucrada la *Candida albicans***
- Intertrigo
 - Perionixis
 - Balanopostitis
 - Querion de Celso
 - Dermatitis del pañal
- 47. La pústula esponjiforme de Kogoj es un hallazgo característico de:**
- Psoriasis
 - Micosis fungoide
 - Impétigo vulgar
 - Lupus eritematoso
 - Queratoacantoma



48. La Malasezia furfur se relaciona con el desarrollo de:

- a. Ectima
- b. Vulvovaginitis
- c. Pitiriasis versicolor
- d. Balanopostitis
- e. Todas las anteriores

49. La enfermedad injerto contra huésped muestra en las fases precoces cambios clínicos e histopatológicos similares a:

- a. Psoriasis

- b. Liquen plano
- c. Dermatomiositis
- d. Linfoma cutáneo de células T
- e. Dermatitis atópica

50. La eritroplasia de Queyrat se localiza principalmente en:

- a. El labio inferior
- b. En la conjuntiva
- c. En la lengua
- d. En el glande
- e. En la región subungueal.