

AUTOEVALUACIÓN N° 08

Dr. Leonardo Sánchez Saldana

01. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la epidermis?

- a.- Los queratinocitos de la capa córnea carecen de núcleos
- b.- La replicación de los queratinocitos se realizan en el estrato espinoso
- c.- La producción de pigmento se realiza en los queratinocitos
- d.- Es un epitelio ricamente vascularizado
- e.- La melanina se localiza en los núcleos de los melanocitos.

02. La proteína más abundante de la dermis es:

- a.- Queratina
- b.- Filagrina
- c.- Colágeno
- d.- Elastina
- e.- Involucrina.

03. La función barrera de la piel se encuentra fundamentalmente en:

- a.- La capa basal
- b.- La capa córnea
- c.- El folículo piloso
- d.- Las glándulas sebáceas
- e.- El colágeno

04. La membrana basal de la piel se encuentra:

- a.- En la unión de la capa córnea con la capa granulosa
- b.- En la unión del la capa córnea con el estrato espinoso
- c.- Entre de dermis papilar y reticular
- d.- Entre la dermis y el tejido celular subcutáneos
- e.- En la unión dermo - epidérmica.

05. Los gránulos de Birbeck se encuentra en:

- a.- Los queratinocitos
- b.- Los melanocitos
- c.- Las células de Langerhans
- d.- Las células de Merkel
- e.- Los linfocitos

06. El estrato lúcido de la piel se observa en:

- a.- Las mejillas
- b.- Los párpados
- c.- Cuero cabelludo
- d.- Las palmas y plantas
- e.- Todas las anteriores

07. La dermis se origina embriológicamente:

- a.- Del ectodermo
- b.- De la cresta neural
- c.- Del mesodermo
- d.- Del germen epitelial primario
- e.- Ninguno de los anteriores

08. Los melanosomas son:

- a.- Organelas citoplasmáticas de los queratinocitos que producen melanina
- b.- Organelas citoplasmáticas de los melanocitos encargadas de la síntesis de melanina
- c.- Organelas nucleares de los queratinocitos encargadas de la síntesis de melanina
- d.- Organelas nucleares de los melanocitos encargadas de la síntesis de melanina
- e.- Organelas citoplasmáticas encargadas de la destrucción de los melanina.

09. De la cresta neural se originan:

- a.- Los queratinocitos
- b.- Los melanocitos
- c.- Los fibroblastos
- d.- Las células de Langerhans
- e.- Los anexos cutáneos

10. Un paciente consulta por presentar una lesión plana, no elevada, originada por extravasación vascular. ¿Cómo lo describiría Ud.?

- a.- Como mácula
- b.- Una placa
- c.- Una pápula
- d.- Una vasculitis
- e.- Un nódulo

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a las glándulas sebáceas?

- a.- Su secreción es ecrina



- b.- Su secreción esta regulada por fibras colinérgicas
 c.- Su secreción es controlada fundamentalmente por estímulos hormonales
 d.- En su mayor parte desembocan en la superficie cutánea libre
 e.- Se encuentra asociada a las glándulas sudoríparas ecrinas.
- 12. ¿Cuál de las siguientes lesiones del enunciado es una lesión elemental primaria?**
 a.- Costra
 b.- Exulceración
 c.- Úlcera
 d.- Vesícula
 e.- Goma
- 13. ¿Cuál de las siguientes lesiones del enunciado es una lesión elemental secundaria?**
 a.- Mácula
 b.- Pápula
 c.- Vesícula
 d.- Quiste
 e.- Atrofia
- 14. ¿Cuál de las siguientes es una lesión elemental secundaria?**
 a.- Ampolla
 b.- Pústula
 c.- Nódulo
 d.- Úlcera
 e.- Quiste
- 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a las excoriaciones?**
 a.- Son lesiones elementales secundarias
 b.- Aparecen en personas con trastornos de la sensibilidad
 c.- Son de morfología anular
 d.- Se localizan en los grandes pliegues
 e.- Son de origen patológico.
- 16. La migración de las células inflamatorias de la dermis a la epidermis se denomina:**
 a.- Infiltración
 b.- Exoserosis
 c.- Exocitosis
 d.- Apoptosis
 e.- Acantolisis
- 17. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la disqueratosis?**
 a.- Es la presencia de núcleos en la capa córnea
 b.- Es el engrosamiento marcado de la capa córnea
 c.- Es la presencia de células epidérmicas malignas
 d.- Es la queratinización precoz de los queratinocitos
 e.- Es el dano de las células de la capa basal.
- 18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con la mácula?**
 a.- Es una lesión elemental secundaria
 b.- Es un cambio de coloración de la piel sin alteración en el relieve
 c.- Es un cambio de coloración de la piel elevada
 d.- Es una lesión elemental primaria deprimida
 e.- Es una lesión dérmica liquenificada
- 19. La inflamación del tejido celular subcutáneo se manifiesta clínicamente por:**
 a.- Pápulas
 b.- Nódulos
 c.- Úlceras
 d.- Liquenificación
 e.- Máculas
- 20. Una lesión húmeda, de superficie lisa y aspecto verrucoso se denomina:**
 a.- Vegetación
 b.- Costra
 c.- Tubérculo
 d.- Papiloma
 e.- Queratosis.
- 21. Una lesión elevada de la piel producida por edema de la dermis y que evoluciona en menos de 24 horas se denomina:**
 a.- Mácula
 b.- Pápula
 c.- Placa
 d.- Habón
 e.- Nódulo.
- 22. Se denomina espongiosis a:**
 a.- Al edema intracelular de los queratinocitos
 b.- Al edema intercelular en la epidermis
 c.- A la degeneración de los queratinocitos basales
 d.- Al infiltrado inflamatorio en la epidermis
 e.- Al infiltrado inflamatorio en la dermis.
- 23. El signo del rocío sangrante de Auspitz se presenta en:**
 a.- Liquen plano
 b.- Mastocitosis
 c.- Púrpura
 d.- Vasculitis leucocitoclástica
 e.- Psoriasis.



24. El signo de Nikolsky se observa en:

- a.- Penfigoide ampollar
- b.- Dermatitis herpetiforme
- c.- Pénfigos
- d.- Eczemas crónicos
- e.- Todas las anteriores

25. El engrosamiento del estrato espinoso se denomina:

- a.- Hiperqueratosis
- b.- Acantosis
- c.- Paraqueratosis
- d.- Hipergranulosis
- e.- Hiperplasia

26. La hiperqueratosis es:

- a.- El engrosamiento de la capa córnea
- b.- El engrosamiento de la capa lúcida
- c.- El engrosamiento del estrato espinoso
- d.- El engrosamiento del estrato granuloso
- e.- El engrosamiento del estrato basal.

27. El raspado metódico de Broca es útil en el diagnóstico de:

- a.- Psoriasis
- b.- Liquen plano
- c.- Mastocitosis
- d.- Parapsoriasis
- e.- Micosis fungoide

28. El 'pitting' ungueal es una manifestación clínica que se presenta en:

- a.- Liquen plano
- b.- Psoriasis
- c.- Alopecia areata
- d.- Dermatomiositis
- e.- lupus eritematoso.

29. La técnica del KOH es útil en el diagnóstico de:

- a.- Dermatofitosis
- b.- Alopecia areata
- c.- Lupus discoide
- d.- Pénfigo
- e.- Tricotilomania

30. La técnica de la epiluminiscencia es útil en el estudio de:

- a.- Los hemangiomas
- b.- Las malformaciones congénitas
- c.- Las lesiones melanocíticas
- d.- Las unas
- e.- Las fotodermatosis.

31. ¿Qué se entiende por queratodermia?

- a.- Una forma de eritrodermia

- b.- Una forma de ictiosis congénita

- c.- Una forma clínica de psoriasis

- d.- Una forma de hiperqueratosis de las palmas y plantas

- e.- Una forma de queratosis de las mucosas.

32. La lesión elemental de la urticaria es:

- a.- La pápula

- b.- El habón

- c.- La vesícula

- d.- La escama

- c.- La costra.

33.- La lesión elemental del acné es:

- a.- La pústula

- b.- La pápula

- c.- El nódulo

- d.- El quiste

- e.- El comedón.

34. La lesión fundamental como se presenta en la psoriasis es:

- a.- Eritema con infiltración

- b.- Eritema y descamación

- c.- Eritema sin descamación

- d.- Eritema sin infiltración

- e.- Ninguna de las anteriores

35. La ausencia de color en el vitíligo se debe a:

- a.- Ausencia congénita de melanocitos

- b.- Ausencia de melanosomas

- c.- Déficit de tirosina

- d.- Ausencia de melanina

- e.- Desaparición de melanocitos.

36. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una mácula?

- a.- Las manchas café con leche

- b.- La mancha mongólica

- c.- El nevus acrómico

- d.- El tatuaje

- e.- La atrofia

37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la liquenificación

- a.- Es una lesión elemental secundaria

- b.- Es un hallazgo histopatológico

- c.- Es una respuesta al rascado crónico

- d.- Es una lesión primaria

- e.- Son ciertas a y c.

38. El fenómeno de Koebner se presenta en:

- a.- La psoriasis

- b.- El vitíligo

- c.- El liquen plano



- d.- Las verrugas vulgares
e.- Todas las anteriores.
- 39. Las estrías de Wickham se observa en:**
a.- Liquen plano
b.- Psoriasis
c.- Lupus eritematoso
d.- Enfermedad de Darier
e.- Alopecia areata
- 40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta es cierta en relación al signo de Nikolsky?**
a.- Es un término histopatológico
b.- Se observa en algunas enfermedades ampollares
c.- Consiste en el despegamiento de la piel al ejercer presión lateral sobre la piel
d.- Es un término que indica progresión de la enfermedad
e.- Son ciertas b y c.
- 41. El signo de Asboe-Hansen se observa en:**
a.- Epidemolisis bulosa
b.- Porfirio cutánea tarda
c.- Todo los tipos de pénfigo
d.- Psoriasis
e.- Liquen plano oral.
- 42. Las estrías de Wickham son producidas por la existencia de:**
a.- Infiltrado liquenoide
b.- Hipergranulosis discontinua
c.- Hiperqueratosis continúa
d.- Degeneración de la interfase dermoepidérmica
e.- Degeneración del colágeno dermal.
- 43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en el fenómeno de Koebner?:**
a.- Se presentan en la psoriasis y el liquen plano
b.- Se presenta en zonas sometidas a traumatismo
c.- Es un fenómeno que se presenta tras la exposición a la radiación solar
d.- Son ciertas a y b
e.- Es un fenómeno inmunológico de sensibilización
- 44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el signo de Asboe-Jansen?**
a.- Aparece en las enfermedades ampollares autoinmunes
b.- Son exclusivos de enfermedades ampollares intraepidérmicas
c.- Aparecen en todas las enfermedades con compromiso muco cutáneo
d.- Es la extensión periférica de las ampollas existentes al ejercer presión vertical sobre ellas.
e.- Son ciertas b y d.
- 45. En las enfermedades ampollares la acantolisis se produce por:**
a.- Espongiosis
b.- Degeneración balonizante de los queratinocitos
c.- Despegamiento entre si de las células epidérmicas
d.- Degeneración reticular de las células
e.- Degeneración hidrópica de la capa basal.
- 46. La mayor cantidad de glándulas apocrinas se encuentra en:**
a.- Las axilas
b.- Los labios
c.- La cara
d.- Los pies
e.- Las manos
- 47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la necrobiosis?**
a.- Es la degeneración del colágeno inducida por el sol
b.- Es la necrosis focal del tejido conectivo rodeado de un granuloma en empalizada
c.- Es la necrosis del tejido celular subcutáneo
d.- Es la acumulación de material fibrilar a nivel de los vasos cutáneos
e.- Es la necrosis focal de los queratinocitos.
- 48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación al signo de Darier?**
a.- Es un signo típico de todas las mastocitosis
b.- Es un signo típico de la psoriasis
c.- Es un signo típico de la disqueratosis folicular
d.- La frotación de la lesión causa edema y prurito
e.- Son ciertas a y d.
- 49. ¿En cuál de las siguientes entidades no está indicado el citodiagnóstico de Tzanck?**
a.- Herpes simple
b.- Chancro sífilítico
c.- Pénfigos
d.- Penfioide ampollar
e.- Dermatitis herpetiforme
- 50. ¿Cuál de las siguientes células epidérmicas deriva de la médula ósea?**
a.- Queratinocitos basales
b.- Células de Merkel
c.- Células de Langerhans
d.- Melanocitos
e.- Ninguna de las anteriores.

RESPUESTAS AUTOEVALUACIÓN

RESPUESTAS CORRECTAS AUTOEVALUACIÓN DE ROSÁCEA Dermatol Peru 2007; 17(1): 6 - 10

1.- a	5.- c	9.- c	13.- a	17.- e
2.- b	6.- d	10.- b	14.- a	18.- c
3.- b	7.- c	11.- d	15.- d	19.- c
4.- e	8.- f	12.- c	16.- c	20.- b

RESPUESTAS AUTOEVALUACIÓN N° 07 Dermatol Peru 2007; 17(1): 11-14

1. c	11. c	21. c	31. b	41. e
2. d	12. d	22. e	32. c	42. b
3. c	13. e	23. a	33. e	43. c
4. d	14. d	24. b.	34. a	44. e
5. b	15. b	25. c	35. d	45. b
6. a	16. a	26. a	36. e	46. e
7. b	17. c	27. b	37. a	47. d
8. e	18. c	28. e	38. b	48. e
9. a	19. b	29. b	39. c	49. e
10. d	20. b	30. c	40. b	50. c